

퍼스트 스타트 60은 한우와 가장 유사한 일본 와규를 위해
특별히 엄선된 고농도의 **첫날 초유**를 초유 **전성분 그대로**
분말화하여 제품화한 프리미엄 천연 초유입니다.

면역글로불린 함량 보증

IgG 60g 이상

*1포당 실제 IgG 함량은 70g (28%) 내외

조단백 40% 이상, 조지방 15% 이상, 수분 8% 이하
USDA(미국농무성), CFIA(캐나다 식품검사청) 승인

◆ 어미 초유 대체 사용(인공포유) 시

2~3 포

1. 태어난 즉시, FS60 1~2포 급이 (3시간 이내 권장)
2. 분만12시간 이내, FS60 1포 추가 급이
3. 이후 2일차부터 대용유 급이

권장 급이농도

250g(1포)+1L



초유: 250g
물: 1L~1.4L

◆ 어미 초유 보충 사용 시

1 포

1. 태어난 즉시, FS60 1포 먼저 급이 (3시간 이내 권장)
2. 이후 어미 초유나 냉동 초유로 최대한 자주, 많이 추가 급이

권장 급이온도

39°C



39°C

1. 눈금있는 용기에 온수(50~60°C)를 750mL까지 채우고
60°C 이상 온수 사용 시 단백질 변성 발생
2. 라벨르 초유 1포(250g)를 넣습니다.
3. 초유 분말이 모두 녹을 때까지 잘 섞어줍니다.
4. 상온의 물을 1.2L 눈금까지 채운 후 다시 섞어줍니다.
5. 초유 온도가 39°C가 되면 송아지에게 급이합니다.

※ 송아지가 태어나면 초유를 최대한 빨리, 많이, 자주 급이하는 것이 중요합니다.

※ 태어난지 3시간이 지나도록 초유 섭취를 못할 경우, 강제투여를 통해서라도 초유를 급이하는 것을 권장합니다.

※ FS60은 첫날 초유의 특성상 지방 함량이 높아 걸쭉합니다. 송아지가 잘 빨지 못하는 경우, 물을 추가하여 농도를 낮춰주십시오.