누카멜 옐로우 한우 급이계획표

일 령	일반 급이	집중 급이
분만 1일차	초유 급이 : 최대한 빨리, 많이	분만 후 3시간 이내, 생시체중의 10%이상(2~4L) 급이 분만 후 12시간 이내, 생시체중의 5%이상(1~2L) 급이

	일반 급이					집중 급이				
	분유량(g)			1일 분유량 합계(g)	1일 급이량 합계(L)	분유량(g)			1일 분유량 합계(g)	1일 급이량 합계(L)
	아침(g)	점심(g)	저녁(g)			아침(g)	점심(g)	저녁(g)		
2-4일	120	120	120	360	2.25	160	160	160	480	3.0
5-7일	160	160	160	480	3.0	200	200	200	600	3.75
2주	240	-	240	480	3.0	320	-	320	640	4.0
3주	320	-	320	640	4.0	400	-	400	800	5.0
4주	400	-	400	800	5.0	480	-	480	960	6.0
5주	400	-	400	800	5.0	480	-	480	960	6.0
6주	400	-	400	800	5.0	480	-	480	960	6.0
7주	320	-	320	640	4.0	400	-	400	800	5.0
8주	240	-	240	480	3.0	320	-	320	640	4.0
9주	160	-	160	320	2.0	240	-	240	480	3.0
10주	-	-	-	-	-	160	-	160	320	2.0
	총 급이량			37.2kg	232.8L	총 급이량			49.2kg	307.3L

▶ 송아지의 상태와 분변을 확인하면서 급이량을 조절하십시오.
송아지가 대용유를 남기는 경우, 강제로 급이하지 않도록 합니다.

- 세포가 형성되는 생애초기(40일/6주령) 영양공급이 송아지의 향후 성장을 결정하므로, 40일령까지는 송아지가 소화하는 범위 내에서 최대한 많은 양을 급이하는 것이 유리합니다.
- 송아지 성장상태, 입붙이기 사료 섭취량에 따라 포유기간을 8~16주 사이로 조절하시고
- 입붙이기 사료 섭취량이 1일 500g에 도달하면 대용유 급이량을 줄이기 시작합니다.

▶ 자판기용 종이컵으로 누카멜 계량하기
깍아서 담으면 110g / 수북히 담으면 120~130g

▶ 분유량별 물 투입량 (160g/L 기준)

분유(g)	물(L)	총량(L)
120	0.63	0.75
160	0.84	1.0
200	1.05	1.25
240	1.26	1.5
320	1.68	2.0
400	2.1	2.5
480	2.52	3.0

권장 급이농도
160g/L
분유(1):160g
물(5):840ml

권장 급이온도
39°C
39°C

1

온수(50~60°C)를 혼합할 분량의 3/4 정도 채웁니다.

2

희석할 정확한 분량의 대용유 분말을 온수에 넣어줍니다.

3

대용유 분말이 모두 녹을 때까지 잘 섞어줍니다.

4

나머지 1/4 정도를 실온의 물로 채운 후 다시 섞어줍니다.

5


대용유 온도가 39°C가 되면 송아지에게 급이합니다.