

일 령

일반 급이

집중 급이

분만 1일차

초유 급이 : 최대한 빨리, 많이

분만 후 3시간 이내, 생시체중의 10%이상(2~4L)

분만 후 12시간 이내, 생시체중의 5%이상(1~2L)

	1회 급이량(L)			1일 합계	
	아침(L)	점심(L)	저녁(L)	급이량(L)	분유량(g)
2 - 4일	1.00	1.00	1.00	3.00	480
5 - 14일	1.25	1.25	1.25	3.75	600
15 - 21일 (3주)	2.00	-	2.00	4.00	640
22 - 42일 (4~6주)	2.50	-	2.50	5.00	800
43 - 49일 (7주)	2.50	-	2.50	5.00	800
50 - 56일 (8주)	2.00	-	2.00	4.00	640
57 - 63일 (9주)	1.00	-	1.00	2.00	320
64 - 70일 (10주)	-	-	-	0.00	0
	총 급이량			257L	41kg

	1회 급이량(L)			1일 합계	
	아침(L)	점심(L)	저녁(L)	급이량(L)	분유량(g)
2 - 4일	1.25	1.25	1.25	3.75	600
5 - 14일	1.50	1.50	1.50	4.50	720
15 - 21일 (3주)	2.50	-	2.50	5.00	800
22 - 42일 (4~6주)	3.00	-	3.00	6.00	960
43 - 49일 (7주)	2.50	-	2.50	5.00	800
50 - 56일 (8주)	2.50	-	2.50	5.00	800
57 - 63일 (9주)	1.50	-	1.50	3.00	480
64 - 70일 (10주)	1.00	-	1.00	2.00	320
	총 급이량			322L	52kg

▶ 위 대용유 급이량은 생시체중이 30kg 내외인 송아지 기준으로 구성된 예시입니다.
1일 대용유 급이량은 체중의 10~20% 기준으로 송아지의 성장 단계 및 건강 상태, 급이 횟수, 기온 등에 따라 조절하시고, 남기는 경우 억지로 급이하지 않도록 합니다.
(기온 10°C 기준, 5°C 하강 시마다 분유량을 5% 추가 급이해야 성장저하 예방)

▶ 세포와 장기가 발달되는 생애 초기(생후 40일/6주)는 송아지의 향후 생산성이 결정되는 중요한 기간이므로, 40일령까지는 고품사료보다 소화흡수율이 높은 대용유를 최대한 많이 급이하는 것이 유리합니다.

▶ 포유기간은 송아지의 성장 상태, 고품사료 섭취량에 따라 8~12주로 조절하시고, 고품사료를 1일 500g 이상 섭취 시, 대용유 감량 시작 및 단계적으로 이유합니다.
(고형사료 섭취량이 부족한 송아지는 반추위가 발달될 때까지 포유기간 연장 권장)

권장 급이농도

160g/L

= 물 1L + 분유 190g

급이량(L)	분유(g)	물(L)
1.00	160	0.84
1.25	200	1.05
1.50	240	1.26
2.00	320	1.68
2.50	400	2.10
3.00	480	2.52

대용유 혼합 순서

1



55°C

초과 금지
(생리활성 성분 손상)

온수(50~55°C)를
급이량의 2/3 준비합니다.

2



분유를 넣고
잘 섞어줍니다.

3



실온의 물로 나머지를 채워
다시 섞어줍니다.

4



39°C
권장 급이온도

온도 확인 후
송아지에게 급이합니다.