

일 령

일반 급이

집중 급이

분만 1일차

초유 급이 : 최대한 빨리, 많이

분만 후 3시간 이내, 생시체중의 10%이상(2~4L)

분만 후 12시간 이내, 생시체중의 5%이상(1~2L)

	1회 급이량(L)			1일 합계	
	아침(L)	점심(L)	저녁(L)	급이량(L)	분유량(g)
2 - 4일	1.25	1.25	1.25	3.75	600
5 - 14일	1.50	1.50	1.50	4.50	720
15 - 21일 (3주)	2.50	-	2.50	5.00	800
22 - 42일 (4~6주)	3.00	-	3.00	6.00	960
43 - 49일 (7주)	2.50	-	2.50	5.00	800
50 - 56일 (8주)	2.00	-	2.00	4.00	640
57 - 63일 (9주)	1.00	-	1.00	2.00	320
64 - 70일 (10주)	-	-	-	0.00	0
	총 급이량			294L	47kg

	1회 급이량(L)			1일 합계	
	아침(L)	점심(L)	저녁(L)	급이량(L)	분유량(g)
2 - 4일	1.50	1.50	1.50	4.50	720
5 - 14일	2.00	2.00	2.00	6.00	960
15 - 21일 (3주)	3.00	-	3.00	6.00	960
22 - 42일 (4~6주)	3.00	-	3.00	6.00	960
43 - 49일 (7주)	2.50	-	2.50	5.00	800
50 - 56일 (8주)	2.50	-	2.50	5.00	800
57 - 63일 (9주)	1.50	-	1.50	3.00	480
64 - 70일 (10주)	1.00	-	1.00	2.00	320
	총 급이량			647L	55kg

▶ 프로테고는 질병과 폐사가 많은 생후 첫 2주의 송아지 면역력과 회복력 향상, 성장촉진을 위한 대용유입니다. 다양한 생리활성 성분이 풍부히 함유된 프로테고의 효과를 제대로 활용하기 위해서는 대용유를 충분히 급이하는 것이 중요합니다. 한우 전환 급이 시, 19~21일령(3일)에 프로테고와 옐로우를 반반 혼합 급이한 후, 22일령(4주령)부터 옐로우로 급이하시면 됩니다. (약한 송아지는 포유 전구간 프로테고 급이 권장)

▶ 세포와 장기가 발달되는 생애 초기(생후 40일/6주)는 향후 생산성이 결정되는 중요한 기간이므로, 고형사료보다 소화흡수율이 높은 대용유를 최대한 많이 급이하시고,

▶ 포유기간은 8~12주가 일반적이지만, 송아지가 고형사료를 1일 500g 이상 섭취하게 되면 대용유를 감량하여 단계적으로 이유시키고, 고형사료 섭취량이 적은 송아지는 반추위가 더 발달될 때까지 포유기간을 늘려주시는 것을 권장드립니다.

권장 급이농도

160g/L

= 물 1L + 분유 190g

급이량(L)	분유(g)	물(L)
1.00	160	0.84
1.25	200	1.05
1.50	240	1.26
2.00	320	1.68
2.50	400	2.10
3.00	480	2.52

대용유 혼합 순서

1



55°C

초과 급이
(생리활성 성분 손상)

온수(50~55°C)를
급이량의 2/3 준비합니다.

2



분유를 넣고
잘 섞어줍니다.

3



실온의 물로 나머지를 채워
다시 섞어줍니다.

4



39°C
권장 급이온도

온도 확인 후
송아지에게 급이합니다.